TC1 – Grundlagen der Theoretischen Chemie

Irene Burghardt (burghardt@chemie.uni-frankfurt.de)

Praktikumsbetreuung:

Konstantin Falahati (k.falahati@yahoo.com)

Jan von Cosel (jvcosel@theochem.uni-frankfurt.de)

Robert Binder (rbinder@theochem.uni-frankfurt.de)

Tianji Ma (beiai@hotmail.de)

Vorlesung: Di 10h-12h, Fr 9h-10h

Übungen: Fr 10h-11h

Web site: <http://www.theochem.uni-frankfurt.de/TC1>

Helium

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left\{ -\frac{2}{r_1} - \frac{2}{r_2} + \frac{1}{r_{12}} \right\} \equiv \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{V}_{1n} + \hat{V}_{2n} + \hat{V}_{12}$$
$$= \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{V}_{12}$$

- Betrachte $\hat{V}_{12}$ zunächst als "Störung"

- $\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{V}_{12}$

mit $\hat{H}^{(0)} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$ wobei $\hat{H}_i = \hat{T}_i + \hat{V}_{1i}$

- berechne Energiekorrekturen als Matrixelemente von $\hat{V}_{12}$ in der Basis der ungestörten Funktionen:

$$E^{(1)} = \langle \psi^{(0)} | \hat{V}_{12} | \psi^{(0)} \rangle$$

Zwei Sorten von Helium: Ortho- und Para-Helium

Termschema (Anregung eines Elektrons)

- Ortho-Helium: $S = 1$ (Triplett), Para-Helium: $S = 0$ (Singulett)

Singulett- und Tripletzustände

4 Kombinationen für zwei Spins $1/2$:

Gesamtspin $S = 1$: Triplet)

$$\begin{aligned} &|\alpha_1\rangle|\alpha_2\rangle \\ &(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle + |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle) \\ &|\beta_1\rangle|\beta_2\rangle \end{aligned}$$

Gesamtspin $S = 0$: Singulett)

$$(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle - |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle)$$

NB: Multiplizität = $2S + 1$

“Gepaarte” und “ungepaarte” Elektronen

- das Bild “gepaarter” ($\uparrow\downarrow$) und “ungepaarter” ($\uparrow\uparrow$) Elektronen ist vereinfacht . . .
- Die Konfiguration $+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}$ ($\alpha\beta$) taucht sowohl im Singulett- als auch in den Triplett-Zuständen auf!

Modell nullter Ordnung: Unabhängige Teilchen

Annahme: $\hat{H}^{(0)} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$

Lösung durch Separationsansatz: $\Psi(r_1, r_2) = \psi_1(r_1)\psi_2(r_2)$

Einsetzen in die Schrödingergleichung ergibt:

$$(\hat{H}_1 + \hat{H}_2)\psi_1(r_1)\psi_2(r_2) = E\psi_1(r_1)\psi_2(r_2)$$

oder

$$\frac{\hat{H}_1\psi_1}{\psi_1} + \frac{\hat{H}_2\psi_2}{\psi_2} = E$$

d.h. jeder Quotient muss einzeln konstant sein:

$$\frac{\hat{H}_1\psi_1}{\psi_1} + \frac{\hat{H}_2\psi_2}{\psi_2} = E_1 + E_2$$

so dass $\hat{H}_1\psi_1 = E_1\psi_1$ und $\hat{H}_2\psi_2 = E_2\psi_2 \longrightarrow E = E_1 + E_2$

Modell erster Ordnung: Erwartungswert von $\hat{H}$ in der Basis der Eigenfunktionen von $\hat{H}^{(0)}$

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{V}_{12} \equiv \hat{H}^{(0)} + \hat{V}_{12}$$

Erwartungswert von H bezüglich der Eigenfunktionen von $\hat{H}^{(0)}$, $\Psi(r_1, r_2) = \psi_1(r_1)\psi_2(r_2)$:

$$\begin{aligned}\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle &= \langle \Psi | \hat{H}_1 | \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{H}_2 | \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{V}_{12} | \Psi \rangle \\ &= E_1 + E_2 + \langle \Psi | \hat{V}_{12} | \Psi \rangle\end{aligned}$$

$\langle \Psi \hat{V}_{12} \Psi \rangle = \text{Energiekorrektur 1. Ordnung}$

Minimal-Basis: Grundzustand ($1s^2$)

- “Ungestörte” Eigenfunktionen von $H^{(0)}$:

$$|\psi^{(0)}\rangle = |n_1 l_1 m_1\rangle |n_2 l_2 m_2\rangle \equiv |n_1 l_1 m_1; n_2 l_2 m_2\rangle$$

Ortsdarstellung: $\psi^{(0)}(r_1, r_2) = \psi_{n_1 l_1 m_1}(r_1) \psi_{n_2 l_2 m_2}(r_2)$

Eigenwerte: $E^{(0)} = -\frac{m_e Z^2 e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \left\{ \frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2} \right\}$

- Betrachte den **Grundzustand $1s^2$** :

$$|\psi_{1s1s}^{(0)}\rangle = |n_1 = 1, l_1 = 0, m_1 = 0; n_2 = 1, l_2 = 0, m_2 = 0\rangle \equiv |a(1)a(2)\rangle$$

Erwartungswert bzgl. des $1s^2$ Grundzustands

$$\begin{aligned}\langle \psi_{1s1s}^{(0)} | \hat{H} | \psi_{1s1s}^{(0)} \rangle &= \langle a(1)a(2) | \hat{H} | a(1)a(2) \rangle \\ &= 2E_a + \langle a(1)a(2) | \hat{V}_{12} | a(1)a(2) \rangle \\ &\equiv 2E_a + J_{aa,aa} \\ &= (-8 \times 13.6 + 34) \text{ eV} = -74.8 \text{ eV}\end{aligned}$$

experimenteller Wert: -78.96 eV

$J_{aa,aa}$ = 2-Elektronen-Coulombintegral

Minimal-Basis: einfach angeregter Zustand (1s2s)

- Nun betrachte einen angeregten Zustand, z.B. 1s2s:

$$|\psi_{1s2s}^{(0)}\rangle = |n_1 = 1, l_1 = 0, m_1 = 0; n_2 = 2, l_2 = 0, m_2 = 0\rangle \equiv |a(1)b(2)\rangle$$

und die dazu symmetrische Wellenfunktion:

$$|\psi_{2s1s}^{(0)}\rangle = |n_1 = 2, l_1 = 0, m_1 = 0; n_2 = 1, l_2 = 0, m_2 = 0\rangle \equiv |b(1)a(2)\rangle$$

- berechne die Matrixelemente der Störung $\hat{H}^{(1)} = \hat{V}_{12}$ in dieser Basis.
Beachte, dass die Störung die beiden Zustände $|a(1)b(2)\rangle$ und $|b(1)a(2)\rangle$ koppeln kann

Helium, cont'd

- In der Basis der Zustände $|a(1)a(2)\rangle$, $|a(1)b(2)\rangle$ und $|b(1)a(2)\rangle$ lautet die Matrixdarstellung des Hamilton-Operators wie folgt:

$$H^{(0)} + H^{(1)} = \left(\begin{array}{c|cc} 2E_a & 0 & 0 \\ \hline 0 & E_a + E_b & 0 \\ 0 & 0 & E_a + E_b \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c|cc} J_{aa,aa} & H_{aa,ab} & H_{aa,ba} \\ \hline H_{aa,ab} & J_{ab,ab} & K_{ab,ba} \\ H_{aa,ba} & K_{ba,ab} & J_{ba,ba} \end{array} \right)$$

- **Coulombintegrale J** (Größenordnung (~ 10 eV))
- **Austauschintegrale K** (Größenordnung (~ 1 eV))
- Ausserdiagonalterme der Art $H_{aa,ab}$ sind vernachlässigbar, da deren Größenordnung (~ 1 eV) deutlich kleiner ist als die Differenz der Diagonalelemente

Helium – Blockdiagonale Hamilton-Matrix

- In der Basis der Zustände $|a(1)a(2)\rangle$, $|a(1)b(2)\rangle$ und $|b(1)a(2)\rangle$ lautet die Matrixdarstellung des Hamilton-Operators wie folgt:

$$H^{(0)} + H^{(1)} = \left(\begin{array}{c|cc} 2E_a & 0 & 0 \\ \hline 0 & E_a + E_b & 0 \\ 0 & 0 & E_a + E_b \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c|cc} J_{aa,aa} & 0 & 0 \\ \hline 0 & J_{ab,ab} & K_{ab,ba} \\ 0 & K_{ba,ab} & J_{ba,ba} \end{array} \right)$$

- **Coulombintegrale J** (Größenordnung (~ 10 eV))
- **Austauschintegrale K** (Größenordnung (~ 1 eV))
- Ausserdiagonalterme der Art $H_{aa,ab}$ wurden in guter Näherung auf Null gesetzt

Coulomb- und Austauschintegrale

Coulombintegrale J , z.B.:

$$\begin{aligned} J_{ab,ab} &= \langle a(1)b(2) | \hat{H}^{(1)} | a(1)b(2) \rangle \\ &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int dr_1 dr_2 \psi_{1s}^*(r_1) \psi_{2s}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{1s}(r_1) \psi_{2s}(r_2) \end{aligned}$$

Austauschintegral K :

$$\begin{aligned} K_{ab,ba} &= \langle a(1)b(2) | \hat{H}^{(1)} | b(1)a(2) \rangle \\ &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int dr_1 dr_2 \psi_{1s}^*(r_1) \psi_{2s}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{2s}(r_1) \psi_{1s}(r_2) \end{aligned}$$

Lösung der Säkulargleichung

Die Lösung der Säkulargleichung ergibt sich **separat** fuer einen 1D-Unterraum (Basisfunktion $|a(1)a(2)\rangle$) und einen 2D-Unterraum (Basisfunktionen $|a(1)b(2)\rangle$ und $|b(1)a(2)\rangle$):

1D-Unterraum:

$$|H_{aa,aa} - E| = 0 \quad \longrightarrow \quad E = H_{aa,aa}$$

2D-Unterraum:

$$\begin{vmatrix} H_{ab,ab} - E & H_{ab,ba} \\ H_{ba,ab} & H_{ba,ba} - E \end{vmatrix} = 0$$

aus Symmetriegründen:

$$\begin{vmatrix} H_{ab,ab} - E & H_{ab,ba} \\ H_{ab,ba} & H_{ab,ab} - E \end{vmatrix} = 0 \quad \longrightarrow \quad E_{\pm} = H_{ab,ab} \pm H_{ab,ba}$$

Helium, cont'd

- Lösung via Säkulardeterminante:

$$|H - E1| = 0$$

- Eigenwerte:

$$E_0 = 2E_a + J_{aa,aa} ; E_{\pm} = E_a + E_b + J_{ab,ab} \pm K_{ab,ba}$$

- Eigenfunktionen:

$$|\psi_0\rangle = |a(1)a(2)\rangle$$

$$|\psi_{\pm}\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}} \left(|a(1)b(2)\rangle \pm |b(1)a(2)\rangle \right)$$

- die beiden Linearkombinationen sind **symmetrisch** bzw. **antisymmetrisch** bzgl. des Austauschs von Elektron 1 vs. 2
- Was ist die Wahrscheinlichkeit, die beiden Elektronen an einem Ort zu finden? (s. Skizze rechts): **Fermi-Loch** vs. **Fermi-Haufen**

Singulett- und Tripletzustände

4 Kombinationen für zwei Spins $1/2$:

Gesamtspin $S = 1$: Triplet)

$$\begin{aligned} &|\alpha_1\rangle|\alpha_2\rangle \\ &(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle + |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle) \\ &|\beta_1\rangle|\beta_2\rangle \end{aligned}$$

Gesamtspin $S = 0$: Singulett)

$$(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle - |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle)$$

NB: Multiplizität = $2S + 1$

Einbeziehung des Spins

4 Kombinationen für zwei Spins 1/2:

symmetrisch (Triplett)

$$\begin{aligned}
 &|\alpha_1\rangle|\alpha_2\rangle \\
 &(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle + |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle) \\
 &|\beta_1\rangle|\beta_2\rangle
 \end{aligned}$$

antisymmetrisch (Singulett)

$$(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle - |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle)$$

Von den möglichen Kombinationen der räumlichen Funktionen $\psi_{\pm}$ mit den Spinfunktionen existieren nur die Hälfte:

antisymmetrisch $\otimes$ antisymmetrisch

$$|\psi_{-}\rangle(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle - |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle)$$

antisymmetrisch $\otimes$ symmetrisch

$$\begin{aligned}
 &|\psi_{-}\rangle|\alpha_1\rangle|\alpha_2\rangle \\
 &|\psi_{-}\rangle(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle + |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle) \\
 &|\psi_{-}\rangle|\beta_1\rangle|\beta_2\rangle
 \end{aligned}$$

symmetrisch $\otimes$ antisymmetrisch

$$|\psi_{+}\rangle(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle - |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle)$$

symmetrisch $\otimes$ symmetrisch

$$\begin{aligned}
 &|\psi_{+}\rangle|\alpha_1\rangle|\alpha_2\rangle \\
 &|\psi_{+}\rangle(1/\sqrt{2})(|\alpha_1\rangle|\beta_2\rangle + |\beta_1\rangle|\alpha_2\rangle) \\
 &|\psi_{+}\rangle|\beta_1\rangle|\beta_2\rangle
 \end{aligned}$$

→ Pauli-Prinzip: Die Gesamtwellenfunktion ist antisymmetrisch!

Ortho- und Para-Helium

- Ortho-Helium: antisymmetrischer Raumanteil, symmetrischer Spinanteil (Triplet)
- Para-Helium: symmetrischer Raumanteil, antisymmetrischer Spinanteil (Singulett)